

Decomoton

Elaborado por Laboratorios Calier S.A.

Presentación:

Solución Inyectable Frasco Multidosis 10 ml.

Composición:

Cada 1 ml de producto contiene:

Carbetocina 0,05 mg

Exipientes c.s.p. 1 ml



Descripción:

Análogo sintético de la oxitocina de elección en el parto y sincronización de éste.

Indicaciones

Cerdas: Agalaxia, Síndrome de Mastitis, Metritis, Agalactia (MMA), regulación del parto.

Vacas: Prevención y coadyuvante en tratamiento de mastitis, metritis y regulador del parto.

Especie destino

Cerdas, vacas.

Posología

Administrar por vía intramuscular o intravenosa muy lenta, una sola dosis y bajo control veterinario.

Cerdas: Regulador del parto y retención láctea postparto: 0,12 ml de Decomoton (0,006 mg Carbetocina) /10 kg p.v. en dosis única

Resto de indicaciones: 0,24-0,4 ml de Decomoton (0,012 – 0,02 mg Carbetocina) /10 kg p.v. en dosis única.

Vacas: 0,3-0,4 ml de Decomoton (0,015 – 0,02 mg Carbetocina) /10 kg p.v. en dosis única.

Contraindicaciones y Advertencias

No administrar con corticoides ni prostaglandinas.

No administrar a animales hipersensibles a la Carbetocina

No administrar para regular el parto si el cuello del útero no está abierto o si existe una alteración mecánica para el retraso del parto.

En caso de sobredosificación puede ocasionar problemas por exceso de descarga láctea, si se sobre dosifica dentro de las 6 horas posteriores al parto.

Período de resguardo

Carne de porcino: cero días.

Carne de bovino: cero días.

Leche de bovino: cero días.

Conservación

Conservar entre 2 y 8°C, una vez abierto utilizar inmediatamente y descartar el producto sobrante.

REG SAG: 2066-B