

Frusemide

Furosemida

SOLUCION INYECTABLE

Diurético de Asa

Composición cada 1 ml:

Furosemida.....50 mg

Excipientes c.s.p.....1ml

**Especies:** Caballos, Bovinos, Gato y Perros**Indicaciones:**

Diurético de asa. Inhibe el transporte de sodio y agua en el asa ascendente de Henle, produciendo diuresis. También se indica para promover la diuresis en cuadros de insuficiencia/falla renal y para favorecer la eliminación de ciertas sustancias, incluyendo elevadas concentraciones de electrolitos, tales como Ca²⁺ y K⁺.

Perros y Gatos: se indica para el tratamiento de enfermedades asociadas a la retención de agua, como edemas de origen hepático, cardiaco o renal.

Bovinos: su uso está indicado para el tratamiento de edemas, principalmente pen casos de edema mamario postparto.

Caballos: se prescribe para el tratamiento de edemas y para prevenir la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio (HPIE).

Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:

Bovinos:

10 mL de Frusemide® (equivalente a 500 mg totales de furosemida), cada 24 horas o 5 mL de Frusemide® (equivalente a 250 mg de furosemida), cada 12 horas.

Caballos:

5 – 10 mL de Frusemide® (equivalente a 250 – 500 mg totales de furosemida), cada 6 – 8 horas.

Perros y Gatos:

0,25 – 0,5 mL de Frusemide® / Kg (equivalente a 2,5 – 5 mg totales de furosemida), cada 6 a 8 horas.

Vía de administración:

Intramuscular y endovenosa

Precauciones:

Frusemide® debe ser administrado con aguja y jeringa hipodérmica, respetando las normas de asepsia para mantener la esterilidad del producto y el o los puntos de inyección. La administración de Frusemide® vía endovenosa debe ser de forma lenta.

No administrar en hembras preñadas

Almacenamiento

Temperatura ambiente entre 15 y 30° C. protegido de la luz solar

Reacciones Adversas:

No se han descrito

Período de Resguardo:

0 días

Presentación: Frasco de 50 ml

Condición de Venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Reg.S.A.G. N° 772