



## Ketofen 10%

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético

**Solución inyectable**

### Composición:

Ketoprofeno 10 mg

Excipientes c.s.p 100 mL

**Especies:** Bovinos y Equinos

### Indicaciones:

**Bovinos:** Tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético, particularmente en: Afecciones respiratorias, edemas mamarios, afecciones músculo-esqueléticas: ayuda en la recuperación después del parto, cojeras, artritis (como complemento del tratamiento etiológico), traumatismos, distocias. Mastitis aguda, cólicos

**Caballos:** Caballos de deporte y carrera: Tratamiento antiinflamatorio y analgésico de los sistemas osteoarticular y músculo-esquelético, más especialmente: Cojeras de origen traumático, artrosis, artritis - Osteítis, esparvarán - Enfermedad navicular - Tendinitis, bursitis - Infosuras - Miositis - Inflamaciones post-quirúrgicas Tratamiento analgésico sintomático de los cólico.

### Vía de administración:

Bovinos: Intramuscular e intravenosa. Caballos: Intravenosa.

### Modo de empleo:

Agitar antes de usar

Administrar en forma aséptica

### Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:

**Bovinos:** 3 mg de principio activo por Kg y por día, es decir 3 mL por cada 100 Kg de peso vivo, durante 1 a 3 días seguidos

**Caballos de deporte y carrera:** Inflamaciones y dolores de los sistemas osteoarticular y músculo esquelético: 2,2 mg de principio activo por Kg y por día, es decir 1 mL por cada 45 Kg de peso vivo, durante 3 a 5 días seguidos. Cólicos: 2,2 mg de principio activo por Kg, es decir 1 mL por cada 45 Kg de peso vivo, una inyección única suele ser suficiente. Un nuevo examen clínico del animal debe preceder a toda inyección suplementaria.





**Advertencias y Contraindicaciones:**

Como otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, el Ketoprofeno está contraindicado en: - Insuficiencia renal grave. - Hemorragia importante. - Combinación con otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, o con diuréticos o anticoagulantes. - No administrar a animales con histórico de hipersensibilidad al Ketoprofeno. - No administrar a caballos destinados a consumo humano.

**Período de Resguardo:**

Bovinos: Carne: 4 días

Leche: Cero días (0)

No administrar a caballos destinados al consumo humano.

**Condiciones de almacenamiento:**

Mantener a temperatura ambiente, en lugar seco entre 15 y 30 °C, en envase original y al abrigo de la luz.

**Presentación:**

Frasco de 100 ml

**Condición de venta**

Venta bajo receta Médico Veterinario

**Reg.S.A.G. 842**