

PENIMAX

Bencilpenicilina Procaína Suspensión Inyectable

Composición:

Cada 1 ml. contiene:

Principio activo: Bencilpenicilina procaína 300 mg.

Excipientes C.S.P. 1 ml.

Especies:

Bovinos y Cerdos.

Indicaciones:

Infecciones del tracto respiratorio (incluyendo neumonía y rinitis atrófica); meningitis; septicemias e infecciones del tracto urogenital causadas por organismos susceptibles a la penicilina como *Arcanobacterium pyogenes*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Streptococcus* spp. Además del tratamiento de cuadros bacterianos secundarios a enfermedades primarias de origen viral causado por organismos sensibles a la penicilina.

Dosis, frecuencia y duración del tratamiento:

20 mg. Bencilpenicilina procaína/Kg peso vivo que equivale a 1 ml/15 Kg de peso.

La dosis debe ser repetida a las 72 horas si los síntomas aún persisten.

Vía de Administración:

Vacas en lactancia y cerdos: Intramuscular.

Bovinos carne: Subcutánea o Intramuscular.

Reacciones Adversas:

Ocasionalmente la administración de penicilinas en cerdos lactantes o en engorda pueden causar pirexia transitoria, vómitos, tiritones, apatía y problemas de coordinación.

Adicionalmente a sido reportado en cerdas preñadas y cerdas jóvenes una descarga vulvar la cual podría estar asociada con abortos.

Período de Resguardo:

Los animales no deben ser sacrificados para consumo humano durante el tratamiento:

Administración subcutánea:

Bovinos: carne 13 días

Administración Intramuscular

Bovinos: Carne 23 días - Leche: 8 días

Cerdos: Carne 10 días.





Condición de almacenamiento

Mantener a temperatura ambiente entre 15 y 30°

Presentación:

Frasco multidosis 100 ml.

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Reg.S.A.G. 2140 B