

AGROVAC IPN-SRS

Vacuna inyectable inactivada

Necrosis pancreática infecciosa y Síndrome Rickettsial del Salmón.

Elaborado por CDV – Argentina.

Presentación:

Frasco multidosis de 2500 dosis o 5000 dosis

Composición cada dosis contiene:

Virus IPN TA-002 correspondiente al serotipo VR-299	5 x 10 ⁷ DICT50%
Virus IPN SS-003 correspondiente al serotipo Sp.	5 x 10 ⁷ DICT50%
Piscirickettsia Salmonis AG5	2,5x10 ⁵ DICT50%
Piscirickettsia Salmonis AG16	2,5x10 ⁵ DICT50%
Excipientes c.s.p.	0,1 mL

Aplicación

Anestésiar los peces, previo a la vacunación, hasta la inmovilización total. Mantener un periodo de ayuno de 48 horas antes, luego retirar la vacuna del refrigerador, 1 hora antes de su aplicación y mantener en ambiente fresco en cajas isotérmicas, distante de cualquier fuente de calor. Agitar muy bien al inicio de la vacunación. Administrar en el punto de inyección ubicado un largo de aleta por delante de la base de las aletas pélvicas, en la línea media ventral, con un ángulo de inyección de 90° respecto al vientre del pez. Realizar el proceso en forma aséptica.

Contraindicaciones:

No vacunar peces enfermos, débiles o estresados. No vacunar peces con un peso menor a 20 gramos. No vacunar durante el período de smoltificación. No vacunar peces reproductores. No vacunar cuando la temperatura del agua sea mayor a 17°C, para evitar la presentación de adherencias. No trasladar los peces al mar antes de 500 UTA, una vez aplicada la vacuna. No efectuar otros tratamientos o manejos con los peces durante el proceso de vacunación.

Especies autorizadas.

Salmón del Atlántico, Salmón del Pacífico, Trucha Arcoiris, Salmón Chinook

Dosis y administración:

0,1mL por pez de al menos 20g de peso, vía de administración intraperitoneal.

Registro SAG: 2130-BP