

Dolvet

Solución inyectable

Composición:

Cada ml contiene

Carprofeno50mg

Excipientes c.s.p 1ml

Especies: Bovinos

Indicaciones:

Indicado como terapia adjunta para el control de la inflamación aguda asociada con enfermedad respiratoria de bovinos de hasta 12 meses de edad.

Dosis:

Bovinos menores de 12 meses de edad se recomienda una dosis única de 1,4 mg de carprofeno/kg de peso corporal (1ml/35 kg)

Vía de Administración:

Administración por inyección subcutánea. Precauciones normales asépticas deben ser consideradas. Masajear el punto de inyección.

Contraindicaciones

No administrar en conjunto a otros AINES o dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento con el producto. No usar en animales con patologías cardíacas, hepáticas o renales, donde exista la posibilidad de ulceración gastrointestinal o hemorragia. Evitar uso en animales deshidratados, hipovolémicos o con hipertensión, ya que constituye un riesgo de incremento de toxicidad renal.

Efectos no deseados

Presencia de sangre oculta en fecas, pérdida de apetito y letargia. Estas reacciones adversas ocurren generalmente durante la primera semana de tratamiento y en la mayoría de los casos transitorias y desaparecen al concluir el tratamiento, raramente son casos serios o fatales. Reacciones locales en el sitio de inyección pueden ser observadas en bovinos jóvenes después de la administración subcutánea, desapareciendo a las 24 horas

Periodo de resguardo

Carne: 10 días

Leche: 0 días



Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase se debe utilizar dentro de los 28 días siguientes.

Presentación

Estuche con frascos multidosis de 50 ml

Condición de venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Resolución SAG:

N 2106