

Secomast

Terapia de secado

Composición:

Cada jeringa de 5,4 g , contiene:

Cloxacilina benzatina.....600mg

Ampicilina trihidrato.....300mg

Excipientes c.s.p 5,4 g



Especies: Bovinos

Indicaciones:

Tratamiento de mastitis subclínica causada por bacterias sensibles a estafilococos al momento de comenzar el periodo de secado.

Dosis: Dosis única, una jeringa por cada cuarto

Vía de Administración: Administración intramamaria

Contraindicaciones

No usar en vacas en lactancia. No administrar en vacas con periodos de sacado corto (menor a 60 días). No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a los componentes de este producto.

Efectos secundarios

No se describen

Periodo de resguardo

Ultimo tratamiento de Secomast debe realizarse al menos 49 días antes del parto. La leche de los animales tratados no debe destinarse a consumo humano al menos 9 días después del parto (18 ordeñas). Carne: 28 días después del tratamiento

Precauciones especiales de conservación:

Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C y protegido de la luz

Presentación

Balde de 120 jeringas y cajas de 24 jeringas. Incluye toallitas húmedas antisépticas.

Condición de Venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Resolución SAG:N 2172-B.