

Ivervet AD

Ivermectina 3,15%

Composición cada ml:

Cada 100 ml de producto contiene:

Ivermectina 3.15 g

Excipientes c.s.p. 100 ml

Especies: Bovinos, Ovejas

Indicaciones:

Tratamiento de parasitosis internas gastrointestinales y pulmonares, y externas causadas por ácaros.

Agentes susceptibles:

Bovinos:

Nematodos gastrointestinales: *Ostertagia ostertagi* (adultos y L4 incluyendo inhibidas), *Haemonchus placei* (adultos, L3 y L4), *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*; pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (adultos, L4 y estados inhibidos); ácaros: *Psoroptes communis* (var. *bovis*).

Ovinos:

Cooperia spp., *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.*, *Nematodirus spp.*

Dosis y vía de administración:

Dosis de ivermectina para bovinos y ovinos corresponde a 630 µg/kg.p.v., que equivalen a 1 ml de producto cada 50 kg.p.v.

Bovinos:

Aplicar en forma subcutánea, por delante o por detrás de la paleta. Se recomienda utilizar una aguja estéril de 20 mm, calibre 16.

Las cantidades a emplear son:

Hasta 50 kg.....1 ml	Hasta 300 kg.....6 ml
Hasta 100 kg.....2 ml	Hasta 350 kg.....7 ml
Hasta 150 kg.....3 ml	Hasta 400 kg.....8 ml
Hasta 200 kg.....4 ml	Hasta 450 kg.....9 ml
Hasta 250 kg.....5 ml	Hasta 500 kg.....10 ml





En caso de bovinos de mayor peso continuar con la misma proporción (1 ml cada 50 kg.p.v.). Los tratamientos deben repetirse de acuerdo al programa sanitario local, y de acuerdo al manejo integrado que indique el médico veterinario. El producto ha demostrado tener 98 días de persistencia contra *Haemonchus placei* y *Ostertagia ostertagi*; y 70 días contra *Oesophagostomum spp.*

Ovinos: 1 ml/50 kg.p.v. vía subcutánea.

A las dosis indicadas el producto posee un efecto residual de por lo menos 6 semanas post tratamiento

Contraindicaciones

No administrar a animales en mal estado general.

No administrar a animales con hipersensibilidad a ivermectina.

No administrar a otras especies animales, ya que puede producirse reacciones adversas severas incluso la muerte.

No administrar en terneros menores de 16 semanas de edad.

No administrar por vía intravenosa o intramuscular.

Periodo de resguardo

Carne bovinos: 122 días

Carne ovinos: 150 días

Leche: no administrar en bovinos cuya leche se destina a consumo humano.

Precauciones especiales de conservación:

Almacenar a temperatura ambiente entre 10 y 30°C y protegido de la luz

Precauciones especiales de conservación:

Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30° C y protegido de la luz

Condición de Venta

Venta bajo receta Médico Veterinario

Presentación

Frasco multidosis de 100 ml y 500 ml

Resolución SAG:

N 1962-B